

# Tibirke Bakker – Naturplejeemner

Anna Bodil Hald.  
Natur & Landbrug ApS  
[www.natlan.dk](http://www.natlan.dk)



November 2018



**Græs-arter og sand-star trives  
alt for godt, hvor der  
har været et stort træ.**

**Fæld i tide, så hedens arter  
ikke fortrænges.**



**Fårene sikrer, at de uønskede gyvel-planter ikke sætter frø.  
Gyvel står pelset (bidt ned). De er ikke væk, men sætter ikke frø**



**De uønskede gyvel-planter kan vokse fra fårene i højden.  
Uden græsning sætter gyvel mange frugter/bælge.**



**Ugræsset**



**Hedelyng planterne dør efter 25-30 år, hvis den ikke forynges.  
Her senil hedelyng under hendøen**





**Hedelyng forynges på myretuer.**

**Mos kan også bidrage til foryngelse af hedelyng**





**Myrer bygger bo i træstub.  
Fremmer hedelyng**





**Ved undergræsning  
overvokser sand-star  
hedelyng tuerne og  
myrerne flytter væk.**





**Revling invaderer hedelyng områder.  
Hedelyng dør.**

**Revling spises ikke af de græssende dyr,  
så de går udenom.**

**Revling hører hjemme på heden,  
men bør begrænses, da den ikke giver  
plads til andre hede-arter**

**Både får og især lidt tungere dyr som hest og kvæg tramper hedelyng, så grene knækker. Herved forynges hedelyng - nye skud**





**Nogle af hedens  
gode følgearter:**

**Blåmunke  
Sandskæg  
Rensdyrlav**

**Bemærk bar bund.  
Det giver liv til insekter mv.**

**Fårene kan ledes rundt i området med vandkar og saltsten.**

**Områder kan hegnes fra midlertidigt med låger og temporære hegn**



**Fårehegn uden strøm hhv.  
Heste-/kreaturhegn med strøm**



Hestefold med opvækst af birk



hhv. hestefold med gyvel med bælg



Blomstring (gul snerre og alm. kongepen)  
i hestefold ved græsningspause

